



Studio Odontoiatrico
Dott. De Luca Giancarlo

Materiale informativo a disposizione del Paziente

Cosa sono le sigillature?

La SIGILLATURA è un'efficace tecnica di prevenzione della carie che consiste nell'applicazione di uno strato di resina composita nei solchi dei molari permanenti, i denti che più frequentemente già durante l'infanzia possono cariarsi. La presenza del materiale resinoso nel solco del dente impedisce il depositarsi di residui di cibo e placca che, se non rimossi con una corretta igiene orale, permettono ai batteri di iniziare a degradare la struttura del dente creando la cavità cariosa. Il bambino spesso non è in grado di eseguire un'accurata igiene con spazzolino e filo interdentale, quindi è importante fare le sigillature entro un anno dall'eruzione di questi denti che avviene solitamente intorno ai 6 anni per i primi molari e intorno ai 12 anni per i secondi molari. Si tratta dei denti più importanti per la masticazione e resteranno in bocca per tutta la vita preservarli è quindi importantissimo.

Le sigillature nei bambini e negli adolescenti sono fortemente indicate in presenza di scarsa igiene orale, nei casi di alta cariorecettività, cioè quando il bambino ha avuto già carie anche nei denti di latte, e in presenza di molari con solchi molto profondi e quindi difficilmente detergibili dallo spazzolino.

La tecnica è rapida indolore e non invasiva, ovvero non prevede l'asportazione di tessuto dentario ed è un ottimo modo per creare un primo approccio sereno del bambino con l'ambiente



Studio Odontoiatrico
Dott. De Luca Giancarlo

odontoiatrico. Il dente da sigillare, preventivamente esaminato per escludere la presenza di carie, viene pulito accuratamente e poi lungo i suoi solchi viene incollata la resina composita di colore solitamente bianco.

È importante essere tempestivi: prima si esegue la sigillatura minore è il rischio che il dente si possa cariare. Studi clinici hanno dimostrato che sono i primissimi anni di permanenza del dente nel cavo orale quelli a più alto rischio di carie della sua superficie masticatoria. Le carie delle superfici interdentali invece devono essere prevenute attraverso l'uso del filo interdentale a partire dai 12 anni, età in cui tutti i denti permanenti, eccetto i denti del giudizio, sono solitamente presenti.