



Studio Odontoiatrico
Dott. De Luca Giancarlo

Materiale informativo a disposizione del Paziente

Cura delle protesi rimovibili

Una protesi viene definita rimovibile (o removibile) quando il paziente stesso può rimuoverla dalla propria bocca. Gli esempi più comuni sono la dentiera e lo scheletrato. Esistono poi delle protesi più complesse, che hanno dei meccanismi di aggancio ad eventuali impianti (bottoni, barre, ecc).

Quale che sia il meccanismo di ritenzione, la manutenzione della protesi è molto semplice, ma richiede costanza e scrupolosità da parte del paziente.

La pulizia dei denti e della protesi deve essere effettuata **dopo ogni pasto**.

La protesi deve essere rimossa dal cavo orale e lavata accuratamente sotto l'acqua con uno spazzolino da denti e sapone da piatti (o di marsiglia). E' consigliabile effettuare questa operazione sopra un lavandino in cui sia presente un po' d'acqua, in modo tale da evitare possibili danni causati da un'eventuale caduta della protesi.

Tutto ciò che si trova in bocca (denti, impianti, ponti, ecc.) deve essere lavato con un altro spazzolino da denti e dentifricio. Gli sciacqui con collutorio aiutano a tenere la bocca pulita. Lo scovolino interdentale ed il filo interdentale spugnoso devono essere usati dove necessario, per esempio tra gli impianti, sotto le barre, ed in tutti quelli spazi non raggiungibili con il normale spazzolino.



Studio Odontoiatrico
Dott. De Luca Giancarlo

ATTENZIONE: Sostanze come acqua ossigenata, candeggina, ammoniacca, bicarbonato, anticalcare, e altre sostanze aggressive **possono danneggiare la protesi in modo irreversibile!!!**

Se è necessario rimuovere la protesi dalla bocca per più tempo, questa deve essere pulita come descritto sopra e conservata in acqua. E' possibile utilizzare delle apposite compresse per la pulizia della protesi, ma queste non sostituiscono la pulizia meccanica con spazzolino.

Per qualsiasi dubbio contattaci e saremo felici di poterti aiutare!